Cutimed Science Card

Cutimed® Sorbion® Sachet S: Un estudio confirma un ahorro de hasta el 28% en el tratamiento de heridas

Estudio >> Panca M. et al. 2013.

Cutimed®

Recomendación de expertos sobre la rentabilidad de los apósitos para el tratamiento del exudado

- La Unión Mundial de Sociedades de Cicatrización de Heridas (WUWHS) subraya que las heridas con exudado de moderado a alto, como las úlceras venosas de la pierna (UVL), suponen una carga para los sistemas sanitarios de todo el mundo[1].
- Los apósitos representan sólo una pequeña parte de los costes del cuidado de heridas. Los principales impulsores son los costes de los cuidados[1].

Atributos para reducir los costes sanitarios

- Tasa de curación
- Tiempo de curación
- Uso de analgésicos
- Frecuencia de cambio de apósito

Indicadores para medir los costes sanitarios

- Los años de vida ajustados por calidad (AVAC) son una medida de los resultados de la salud. A un año de salud perfecta se le da un valor de 1,0. A los años con deficiencias se les asigna un valor entre 0 y 1 en función de la gravedad de la deficiencia.
- La rentabilidad de los apósitos se define como el coste por AVAC ganados.

Los apósitos con mejores resultados en atributos y a menor coste son opciones favorables

Referencias

1. World Union of Wound Healing Societies (WUWHS) (2019). Consensus Document. Wound exudate: effective assessment and management. London: Wounds International
2. Panca M et al. Clinical and cost-effectiveness of absorbent dressings in the treatment of highly exuding VLUs. J Wound Care. 2013; 22:109-10, 112-8.
3. Vermeulen H et al. Preferences of patients, doctors, and nurses regarding wound dressing characteristics: a conjoint analysis. Wound Repair Regen. 2007; 15:302–307.

El estudio

Antecedentes: Estudio comparativo[2] para estimar la efectividad clínica y de coste efectividad de 1 fibra gelificante*(Aquacel®) y 4 apósitos superabsorbentes (DryMax® Extra, Fliwasorb®, KerraMax® Care™, Sachet S**) desde la perspectiva del Servicio Nacional de Salud (SNS).

Método: Se construyó un modelo de decisión que representa las vías de los pacientes y la gestión asociada de una cohorte de 439 pacientes con VLU crónicas altamente exudativas de 3 meses de edad. El modelo se basó en los registros de casos de pacientes emparejados de la base de datos The Health Improvement Network (una base de datos (una base de datos representativa a nivel nacional de pacientes registrados por médicos generalistas en el Reino Unido) que fueron tratados con uno de los 5 apósitos. El modelo estimó los costes y los resultados del tratamiento de los pacientes durante 6 meses y la relación coste-eficacia del uso de cada apósito.

Resultados: En comparación con los tres superapósitos restantes, el uso de Cutimed® Sorbion® Sachet S supuso hasta un 28% menos de costes para el tratamiento de la VLU y mejoró en mayor medida el estado de salud de los pacientes: Los pacientes ganaron entre un 0,3 y un 3% más de AVAC.

* Aquacel® es una fibra gelificante de carboximetilcelulosa (CMC). Las heridas tratadas con Aquacel® que permanecían sin cicatrizar aumentaron de tamaño un 43% durante el periodo de estudio, mientras que las heridas sin cicatrizar tratadas con los otros apósitos disminuyeron de tamaño una media del 34%. En consecuencia, Aquacel® se excluyó del análisis de rentabilidad.
**Idéntico a Cutimed® Sorbion® Sachet S (BSN medical GmbH).

Primera opción

Resultado clínico

Clasificación de atributos



Tabla 1. Para la evaluación de los resultados clínicos, se definieron y puntuaron los atributos más importantes (Vermeulen et al.[3]) de la siguiente manera: Tasa de curación = 14, tiempo de curación = 5, frecuencia de cambio de apósito = 14, uso de analgésicos = 7. Los superabsorbentes se puntuaron para cada uno de los atributos según una escala de 1 a 4. El valor respectivo se multiplicó por las puntuaciones de los atributos. Cuanto mayor era la puntuación, mejor resultado clínico.

Hasta un 28% menos de costes

Costes totales

por paciente en comparación



Cuadro 2 Coste total de la atención por paciente para el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido en el tratamiento de la úlcera venosa de la pierna durante 6 meses

Walzer et al. (2018) realizaron un estudio actualizado utilizando comparadores relevantes y datos de costes actuales. Lea los datos más recientes sobre la rentabilidad de los apósitos para el tratamiento del exudado:

Conclusión para la práctica clínica

WUWHS muestra que el factor más importante para la rentabilidad es la reducción de los costes de atención por factores tales como la frecuencia de los cambios de apósito. Cutimed® Sorbion® Sachet S cumple con los requisitos WUWHS y es una opción favorable debido a las mejores tasas de curación y menos cambios de apósito en comparación con los productos de la competencia. Cutimed® Sorbion® Sachet S reduce los costos totales de terapia por paciente hasta en un 28%. Además, los pacientes ganaron entre un 0,3 y un 3% más de AVAC.

Cutimed® Sorbion® Sachet S

Cutimed® es una marca registradas de Essity.
Sorbion® es marca registrada de Essity.
Sorbact® es marca registrada de ABIGO Medical AB.

©MD Información destinada a profesionales de la salud. Los productos mencionados son productos sanitarios.
Aconsejamos leer las instrucciones de utilización y el etiquetado antes de su utilización.

essity | Health & Medical

Tel.: 93 521 01 20
Fax:93 521 02 10

HOSAWC192025

Cutimed®